

[Мед.Курсовик](#) - быстро, дешево, надежно!

Расстройства психики при COVID-19

Государственный медицинский университет Кафедра гистологии, эмбриологии,
цитологии

Научный руководитель:

Введение: Коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома 2 (SARS-CoV-2) является высококонтагиозным вирусным агентом и заболевание, которое он вызывает – COVID-19 является смертельным и в 2020 году достигла масштабов пандемии, которая длится по настоящее время. В ходе различных исследований было выявлено, что COVID-19 связан с большим количеством расстройств психики у некоторых групп людей, которые включают больных COVID-19 и медицинских работников, проводящие лечение пациента с подтвержденным COVID-19 или даже с подозрением на него. В данном литературном обзоре была проанализирована эпидемиология, течение заболевания клинические особенности и лечению психических расстройств, которые связаны с пандемией COVID-19.

Цели: Изучить расстройства психики, которые связаны с COVID-19.

Материалы и методы: Был проведен анализ отечественной и зарубежной медицинской литературы по данной теме за последние пять лет.

Результаты и обсуждение: Ограниченное число исследований описывает распространенность психических осложнений, связанных с COVID-19.

Существует очень мало данных о психических заболеваниях у пациентов с COVID, но исследования предыдущих эпидемий коронавируса показали, что у многих пациентов с COVID будут проявляться психические симптомы и расстройства. Примером может служить систематический обзор психиатрических проблем у госпитализированных пациентов с MERS или SARS (60 исследований, n>2500 случаев). Исследование показало, что во время острой инфекции примерно от 20 до 40% пациентов проявлялись нервно-психические симптомы, соответствующие делирию: